


Grünland-Ticker



Grünland-/Weide-Tipps 08.04.2019



Der Weidefutterzuwachs erreicht im Süd-Osten des Landes bis zu 26 kg TM pro ha pro Tag. Umgerechnet auf einen Viehbesatz von 7 Milchkühen pro ha, kann mit diesem Weidezuwachs ein Mindest-Weideanteil (min. Weide) von 3,8 kg TM pro Kuh pro Tag in der Futterration erreicht werden.


Die tägliche Weidefutteraufnahme einer Kuh wird durch folgende Faktoren begrenzt:

- die täglich eingeschränkte Anzahl an Futterbissen,
- die begrenzte Futtermenge pro Bissen,
- die effektiv zur Verfügung stehende Fresszeit,
- die Qualität des Weidefutters.

Es ist also wichtig Pflanzenbestände mit wertvollen Gräsern, wie z. Bsp. *Englisches Raygras*, zu beweiden.

Achtung: das Englische Raygras kann schnell mit der minderwertigen Gemeinen Risse verwechselt werden, da beide eine glänzende Blattunterseite haben!

Englisches Raygras:



Gemeine Risse:

- Verfilzendes Untergras
- Muffiger Geruch
- Stickstoff- und feuchteliebend
- Frühblühend, guter erster Aufwuchs
- ab dem zweiten Aufwuchs stark reduzierter Ertrag
- Kann nach dem ersten Schnitt durch Striegeln und regelmässige Nachsaat zurückgedrängt werden

